

10 signes pouvant indiquer une immunodéficience primaire

Enfants de 0 à 18 ans

Si votre enfant présente deux ou plus de ces signes, demandez à votre docteur s'il pourrait souffrir d'immunodéficience primaire. Cela pourrait sauver la vie de votre enfant.

- 1 Quatre nouvelles infections de l'oreille ou plus en un an
- 2 Deux infections graves des sinus ou plus en un an
- 3 Antibiotiques pendant deux mois ou plus, sans grande amélioration
- 4 Deux pneumonies ou plus en un an
- 5 Absence chronique de gain de poids ou de croissance
- 6 Récurrence d'abcès cutanés profonds ou d'abcès des organes
- 7 Candidose buccale ou mycose cutanée persistante
- 8 Besoin d'antibiotiques par intraveineuse pour guérir les infections
- 9 Deux infections profondes ou plus, dont la septicémie
- 10 Antécédents familiaux d'immunodéficience primaire

Les adultes

Si vous présentez deux ou plus de ces signes, demandez à votre docteur si vous pourriez souffrir d'immunodéficience primaire.

- 1 Deux nouvelles infections de l'oreille ou plus en un an
- 2 Deux nouvelles infections des sinus ou plus en un an, en l'absence d'allergie
- 3 Une pneumonie par an, pendant plusieurs années
- 4 Diarrhée chronique avec perte de poids
- 5 Infections virales récurrentes (rhumes, herpès, verrues, condylomes)
- 6 Besoin récurrent d'antibiotiques par intraveineuse pour guérir les infections
- 7 Récurrence d'abcès cutanés profonds ou d'abcès des organes internes
- 8 Candidose buccale ou mycose cutanée ou autre persistantes
- 9 Infection par des bactéries normalement banales s'apparentant à celles qui causent la tuberculose
- 10 Antécédents familiaux d'immunodéficience primaire

Ces listes de signes ont été préparées par le conseil médical consultatif de la Jeffrey Modell Foundation. Il est vivement suggéré de consulter des spécialistes de l'immunodéficience primaire. ©2009 Jeffrey Modell Foundation



Immunodeficiency
Canada
Immunodéficience
Canada

www.immunodeficiency.ca